



Permanente acitesdrain

CRN

Binnenkort komt u naar de afdeling CRN van het Deventer Ziekenhuis voor een permanente acitesdrain. In deze folder leest u meer over de behandeling.

Permanente ascitesdrain

In overleg met uw arts krijgt u een permanente ascitesdrain, om het opgehoopte vocht in de buik af te voeren. Voor het inbrengen van de katheter wordt u voor één dag opgenomen. Als alles goed gaat, kunt u nog op dezelfde dag naar huis.



Waarom krijgt u een permanente ascitesdrain

U heeft al enige tijd last van een dikke opgezette buik. Dit komt doordat er teveel vocht in de buikholte zit. De medische term hiervoor is ascites. Voor de afvoer van het vocht heeft u de afgelopen periode puncties (drainages) gehad. Met een permanente drain kunt u het vocht thuis zelf afvoeren.

Wat is een permanente ascitesdrain?

Een permanente ascitesdrain is een flexibele slang van ongeveer 40 cm lang met daarop een manchet. Een manchet is een iets dikker deel van de katheter, gemaakt van zacht materiaal. Het deel van de katheter met de manchet wordt onder de huid ingebracht. De manchet groeit vast in het weefsel onder de huid zodat de katheter er niet uit glijdt. Om ontstekingen te voorkomen, wordt de katheter eerst een stukje onder de huid ingebracht. Van daaruit wordt de katheter verder naar de vrije buikholte geschoven. Aan het uiteinde van de katheter in de buikholte zitten kleine gaatjes. Hierdoor stroomt het vocht vanuit de buikholte gemakkelijk naar buiten. Het uiteinde van de katheter buiten het lichaam is afgesloten met een dopje. De vloeistof kan er daardoor alleen uitlopen als u de katheter aansluit op een speciale afloopslang met een opvangzak.

Opname

Voor het plaatsen van de permanente ascitesdrain wordt u opgenomen op een verpleegafdeling, of u bent al opgenomen. Kom in ieder geval op de afgesproken dag en tijd naar de verpleegafdeling die u hebt doorgekregen.

Medicijngebruik

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan vertelt uw verwijzend arts u of en wanneer u met deze medicijnen moet stoppen en wanneer u het gebruik weer kunt hervatten. Voor de behandeling wordt dan bloed afgenomen om de stolling te controleren. Alle overige medicijnen mogen volgens schema ingenomen worden met een beetje water.

De behandeling

U komt in bed naar de afdeling CRN. De laborant geeft u een uitleg over het verloop van de behandeling. De radioloog zoekt met een echografie-apparaat de juiste plaats voor de punctie door langzaam over uw buik te strijken.

Wanneer de precieze plaats bekend is, wordt de plaats gedesinfecteerd en komt er een steriele doek over het gebied. De radioloog verdooft de plaats waar de drain wordt ingebracht en maakt een klein sneetje in de huid. Vervolgens schuift de arts de katheter eerst een stukje onder de huid door en daarna de buikholt in. Als het vocht uit de buik goed wegloopt, ligt de katheter goed. Een klein deel van de katheter ligt buiten uw buik en wordt afgesloten met een dopje. Omdat de manchet enige tijd nodig heeft om vast te groeien, wordt het uiteinde van de katheter eerst vastgezet met een hechting.



Mogelijke complicaties

De risico's van de behandeling zijn zeer gering. Uw verwijzend specialist heeft, samen met u, een goede afweging moeten maken tussen de eventuele risico's van de behandeling en het belang van de behandeling. Als u de dagen na de behandeling onverklaarbare pijnklachten heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de Spoed Eisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.

Duur

De behandeling duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk en de insteekopening van de drain. Het kan zijn dat uw buik wat pijnlijk is, alsof u een flinke blauwe plek heeft. De verpleegkundige controleert hoeveel vocht er afloopt. De thuiszorg geeft u uitleg over de verzorging en het gebruik van de katheter.

Bijwerkingen

Door afname van het vocht uit de buik is het mogelijk dat de bloeddruk daalt. Het is belangrijk dat u na de behandeling rustig blijft liggen of zitten, u kunt namelijk duizelig worden door een verlaagde bloeddruk. Tijdens of na de ascitesdrainage kunt u last hebben van buikkrampen.

Vragen/Verhinderd?

Bel dan de afdeling CRN, tel.: (0570) 535 135 of informeer bij de verpleegkundige of uw behandelend arts. Bent u verhinderd? Laat dit dan op tijd weten. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden geholpen.

Uw rechten en plichten. Kent u ze?

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.



Algemene contactgegevens

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl