



Pijnstillende/ontstekingsremmende injectie onder echobegeleiding

CRN

Binnenkort komt u naar de afdeling CRN van het Deventer Ziekenhuis voor een pijnstillende/ontstekingsremmende behandeling onder echobegeleiding

Wat is een pijnstillende/ontstekingsremmende injectie onder echobegeleiding?

Dit is een behandeling waarbij een pijnstiller (Lidocaïne) en een ontstekingsremmer (Kenacort) wordt ingespoten. Met behulp van een echografieapparaat wordt de juiste prikplaats bepaald. De injectie onderdrukt de ontstekingsreactie in de weefsels en vermindert zo de pijn en de zwelling. De pijnstiller Lidocaïne werkt gelijk en houdt 2 tot 3 uur aan. De ontstekingsremmer Kenacort heeft enkele dagen tot weken nodig, voordat u hiervan de werking kunt waarnemen.

Vorbereiding

Voor deze behandeling hoeft u zich niet speciaal voor te bereiden.

Melden

U meldt zich 10 minuten vóór de afspraaktijd met een geldige patiëntenpas aan de balie van de afdeling CRN, route 45.

Voor de behandeling

De echo-assistent(e) haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedkamer. Hier ontbloot u de plek van injectie.

De behandeling

In de echokamer gaat u op de onderzoektafel liggen of zitten. Met behulp van het echografieapparaat wordt de plaats bepaald voor de injectie. De prikplek wordt met gedesinfecteerd en de radioloog brengt met een naald de ontstekingsremmer en de verdoving in. Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.



Risico's, bijwerkingen en complicaties

Bij Kenacort zijn de volgende bijwerkingen mogelijk:

- Uw gezicht kan enkele dagen roder kleuren dan normaal. Dit verdwijnt na enkele dagen.
- Bij diabetes patiënten kan het bloedsuikergehalte de eerste 2 weken na de injectie ontregeld zijn. Controleer uw bloedsuiker extra goed.
- Er kunnen hartkloppingen/hartritmeversnelling optreden, deze zijn van onschuldige en voorbijgaande aard.
- Plaatselijk kan de huid verkleuren of dunner worden.
- Een allergische reactie als gevolg van de injectie komt zeer zelden tot niet voor.

Na de injectie

We raden u aan na het onderzoek niet zelf auto te rijden of te fietsen.

De pijnklachten kunnen de eerste 3 dagen, als reactie op de injectie, verergeren. Soms ontstaat wat zwelling en warmte op de plek waar de prik is gegeven. Voor pijnstilling kunt u paracetamol 500 mg. gebruiken, 4 tot 6 tabletten per dag. Een ice pack kan ook verlichting geven.

U kunt uw arm of ander ingespoten gewricht gewoon gebruiken na deze behandeling. Krijgt u nog fysiotherapie? Neem dan contact op met uw behandelend specialist en vraag of dit voort gezet kan worden.

Uitslag/resultaat

De radioloog maakt een verslag van deze ingreep. Bij uw behandelend arts kunt u terecht voor de verdere behandeling.

Wanneer contact opnemen?

Als u na het onderzoek een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met de polikliniek Orthopedie, tel.: (0570) 53 51 55.

's Avonds en in het weekend kunt u de Spoedeisende Hulp bellen, tel.: (0570) 53 00 00.

- Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
- Roodheid en/of hevige pijn die niet overgaat en niet voldoende reageert op koeling en pijnstilling.

Geef aan dat u een injectie met een ontstekingsremmer heeft gehad.

Vragen/verhinderd?

Bel dan het de afdeling CRN, tel.: (0570) 53 51 35.

Bent u verhinderd? Laat dit dan op tijd weten. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden geholpen



Uw rechten en plichten. Kent u ze?

Wij doen er alles aan om u de beste zorg en behandeling te geven. Dat doen we samen met u. Voor zowel u als de zorgverlener zijn er rechten en plichten. Het is belangrijk dat u ze kent. Bijvoorbeeld wat mag ik van mijn zorgverlener verwachten? Waar kan ik mijn medische gegevens inzien? Wat houdt het recht op privacy in? U leest ze op www.dz.nl/rechtenenplichten.

Algemene contactgegevens

*Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer*

*Tel. nr.: 0570 53 53 53
info@dz.nl
www.dz.nl*