

Chlamydia trachomatis: diagnostiek naar C. trachomatis infectie, inclusief lymfogranuloma venereum (LGV)

Status van infectie	Soort onderzoek en af te nemen materiaal.
Screening op SOA	• Mannen: 1^e keus: eerste straal ochtendurine; 2^e keus: urethra-uitstrijk • Vrouwen: 1^e keus: vagina-, cervix- of urethrauitstrijk, 2^e keus: eerste straals ochtendurine
Proctitis en LGV	• Rectumwat in M4RT-medium • Indien mogelijk: inhoud van abces / bubo • 1-malige buis stolbloed
Primaire/secundaire infertiliteit	• Eénmalige buis stolbloed
Neonatale lage luchtweginfectie	• Serumpaars: 2 buizen stolbloed met tenminste 2 weken tussenpoos
Neonatale conjunctivitis	• Afstrijk conjunctivae in eSwab-medium
Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?	
Afnames materiaal	• eSwab-medium voor uitstrijk van urethra, cervix, vagina, rectum of conjunctivae • Stolbloedbuis voor afnemen van stolbloed
Wat te doen na afname	Zo spoedig mogelijk naar LMMI Stolbloed max. 24 uur in de koelkast. eSwab-medium max. 24 uur in de koelkast
Geschatte duur onderzoek	Serologie: 5-7 dagen PCR: 1-4 dagen