

**Herpes simplex virus (HSV): diagnostiek naar HSV infectie
(koortslip, stomatitis, herpes genitalis, encefalitis)**

Status van infectie	Soort onderzoek en af te nemen materiaal.
Koortslip Stomatitis Herpes genitalis Herpes encefalitis Immunogecompromitteerde pat.	• Doorgaans geen diagnostiek geïndiceerd; indien nodig: PCR uit afstrijk blaasjes • PCR uit afstrijk blaasjes mond • PCR uit afstrijk genitale blaasjes • PCR uit liquor • Serologisch onderzoek uit stolbloed; 2 afnames met tenminste 2 weken tussenpoos • PCR uit plasma (uit EDTA-bloed)
Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?	
Afname materiaal	• Stolbloedbuis voor afnemen van stolbloed • eSwab-medium voor PCR • Liquorbuisje voor liquor • EDTA-buis voor EDTA-bloed
Wat te doen na afname	Zo spoedig mogelijk naar LMMI Stolbloed max. 24 uur in de koelkast. eSwab-medium max. 24 uur in de koelkast Liquorbuis max. 24 uur in de koelkast EDTA-bloed na afname <u>CITO</u> naar LMMI
Geschatte duur onderzoek	Serologie: 3-5 dagen PCR: 2-5 dagen