

Intravasale lijntip - kweek

Soort onderzoek	Kweek van tip van intravasale lijn.
Te onderzoeken patiënten-materiaal	Meest distale deel van een intravasale lijn (3-5 cm). In het laboratorium wordt deze lijntip d.m.v. uitrollen op media semikwantitatief gekweekt. NB bij verdenking op een lijnsepsis ook 2 bloedkweken afnemen via venapunctie.
Afname materialen	Steriel potje 
Afname instructies	Desinfecteer de huidpoort waardoor de lijn 'naar binnen gaat'. Verwijder de lijn. Knip 3-5 cm van het uiterste eind van de lijn af met een steriele schaar. Doe deze in een steriel potje.
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HiX SC of LMMI aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Voorzie deze van: - benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname etc. - vul in om wat voor lijn het gaat (subclavia, lieslijn,) - het gewenste onderzoek in: banale kweek
Transport naar laboratorium	Op dag van afname op het LMMI (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	Na afname max. 24 uur in de koelkast bewaren.
Geschatte duur onderzoek	2-4 dagen